

Cholera


d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 6 ราย จาก 3 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.01 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.20 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ >65 ปี (33.33 %) 15-24 ปี (16.67 %) 35-44 ปี (16.67 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 100.0 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 33.3 งานบ้านร้อยละ 16.7 นักบวชร้อยละ 16.7

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (1 ราย), 35-44 ปี (1 ราย), >65 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ

ชนิดของเชื้อ/สาร จำนวน ร้อยละ		
NA	1	16.7
NA	5	83.3



อัตราต่อแสนประชากร

