

Dysentery, Bacillary


d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 226 ราย จาก 44 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.34 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.33 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี (20.35 %) >65 ปี (17.70 %) 55-64 ปี (17.26 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.0 อื่นๆร้อยละ 3.1 พม่าร้อยละ 0.9 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 34.5 นักเรียนร้อยละ 19.0 เกษตรร้อยละ 17.7

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (17 ราย), >65 ปี (11 ราย), 15-24 ปี (9 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (17 ราย), 55-64 ปี (15 ราย), 45-54 ปี (8 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (11 ราย), 15-24 ปี (8 ราย), 25-34 ปี (7 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (3 ราย), 25-34 ปี (3 ราย), 35-44 ปี (2 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of Dysentery, Bacillary cases by week of onset and region.

2566

