

Paratyphoid

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 206 ราย จาก 37 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.31 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.98 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 35-44 ปี (19.90 %) 45-54 ปี (17.96 %) 55-64 ปี (15.53 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 88.8 อื่นๆร้อยละ 10.7 กัมพูชาร้อยละ 0.5 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 38.8 รับจ้างร้อยละ 21.4 เกษตรร้อยละ 17.5

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (23 ราย), 45-54 ปี (16 ราย), 55-64 ปี (12 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (6 ราย), 55-64 ปี (5 ราย), 35-44 ปี (4 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (13 ราย), 45-54 ปี (9 ราย), 35-44 ปี (7 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (11 ราย), 55-64 ปี (8 ราย), 35-44 ปี (7 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



Number of Paratyphoid cases by week of onset and region.

2566

