

## Pertussis

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 423 ราย จาก 14 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.64 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 4 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.94 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี (66.67 %) 7-9 ปี (9.22 %) 10-14 ปี (7.80 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 100.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ไม่ปกครองร้อยละ 68.1 นักเรียนร้อยละ 23.9 งานบ้านร้อยละ 2.6

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (3 ราย), 4 ปี (2 ราย), >65 ปี (2 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 1-3 เดือน (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 1-3 เดือน (1 ราย), 4 ปี (1 ราย), 35-44 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 1 ปี (61 ราย), 2 ปี (45 ราย), 1-3 เดือน (40 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



Number of Pertussis cases by week of onset and region.

2566

