



Malaria

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 5034 ราย จาก 59 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 7.61 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 4 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.55 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (22.96 %) 25-34 ปี (16.67 %) 35-44 ปี (13.85 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 72.6 พม่าร้อยละ 21.6 อื่นๆร้อยละ 5.6 ลาวร้อยละ 0.1 กัมพูชาร้อยละ 0.1 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 27.5 รับจ้างร้อยละ 24.9 เกษตรร้อยละ 22.1

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (315 ราย), 25-34 ปี (255 ราย), 35-44 ปี (251 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (14 ราย), 15-24 ปี (6 ราย), 55-64 ปี (5 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (749 ราย), 25-34 ปี (475 ราย), 35-44 ปี (340 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (104 ราย), 45-54 ปี (97 ราย), 25-34 ปี (95 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร		
☐ 0	☐ 0.01-10	☐ >10-50
☐ >50-100	☐ >100-500	☐ >500
ชนิดของเชื้อ/สาร	จำนวน	ร้อยละ
PF : Plasmodium falciparum	75	1.5
PV : Plasmodium vivax	2981	59.2
PM : Plasmodium malariae	46	0.9
Mixed type	8	0.2
Unknown	1924	38.2