

Syphilis

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 20135 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 30.43 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 6 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.66 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (38.22 %) 25-34 ปี (27.18 %) 35-44 ปี (11.98 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 90.9 พม่าร้อยละ 4.1 อื่นๆร้อยละ 2.8 ก้มพูชาร้อยละ 1.3 ลาว.r้อยละ 0.8 จีน/อ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.0 เวียดนามร้อยละ 0.0 มาเลเซียร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 40.4 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 26.0 นักเรียนร้อยละ 17.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ

แรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พbmagaในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (3062 ราย), 25-34 ปี (2443 ราย), 35-44 ปี (1134 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พbmagaในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2534 ราย), 25-34 ปี (1445 ราย), 35-44 ปี (557 ราย),
- ภาคเหนือ พbmagaในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1569 ราย), 25-34 ปี (998 ราย), 35-44 ปี (418 ราย),
- ภาคใต้ พbmagaในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (586 ราย), 15-24 ปี (531 ราย), 35-44 ปี (304 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร

0 0.01-0.20 0.21-0.40
 0.41-0.60 0.61-0.80 0.81-1

Number of Syphilis cases by week of onset and region.
2566

