

Gonorrhoea

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 12184 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 18.41 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.15 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (62.30 %) 25-34 ปี (21.18 %) 35-44 ปี (7.15 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.4 อื่นๆร้อยละ 2.2 พม่าร้อยละ 1.6 ลาวร้อยละ 0.5 กัมพูชาร้อยละ 0.2 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.0 มาเลเซียร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 37.0 รับจ้างร้อยละ 29.3 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 19.5

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2312 ราย), 25-34 ปี (1224 ราย), 35-44 ปี (405 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2760 ราย), 25-34 ปี (641 ราย), 35-44 ปี (230 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1908 ราย), 25-34 ปี (501 ราย), 35-44 ปี (163 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (611 ราย), 25-34 ปี (215 ราย), 35-44 ปี (73 ราย),



ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร



Number of Gonorrhoea cases by week of onset and region.
2566

