

## L.G.V.&other&unsp.V.D.


d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 176 ราย จาก 51 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.27 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.93 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (35.23 %) 35-44 ปี (19.32 %) 25-34 ปี (18.75 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 93.2 อื่นๆร้อยละ 4.0 พม่าร้อยละ 1.7 กัมพูชาร้อยละ 0.6 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.6 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 35.2 นักเรียนร้อยละ 25.0 ไม่ทราบอาชีพ/ไม่ปกครองร้อยละ 20.5

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (17 ราย), 35-44 ปี (16 ราย), 25-34 ปี (10 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (17 ราย), 15-24 ปี (15 ราย), 45-54 ปี (5 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (16 ราย), 35-44 ปี (10 ราย), 45-54 ปี (6 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (14 ราย), 35-44 ปี (7 ราย), 45-54 ปี (4 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of L.G.V.&other&unsp.V.D. cases by week of onset and region, 2566

