

Scrub Typhus

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 8543 ราย จาก 70 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 12.91 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 7 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.01 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.77 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 45-54 ปี (18.08 %) 55-64 ปี (17.52 %) >65 ปี (17.25 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.0 พม่าร้อยละ 1.9 อื่นๆร้อยละ 0.7 ลาวร้อยละ 0.3 กัมพูชาร้อยละ 0.0 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 40.8 รับจ้างร้อยละ 22.4 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 15.6

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (23 ราย), 55-64 ปี (21 ราย), 45-54 ปี (18 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉิยงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (735 ราย), 55-64 ปี (682 ราย), 45-54 ปี (668 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (753 ราย), 45-54 ปี (720 ราย), 25-34 ปี (656 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (177 ราย), 35-44 ปี (163 ราย), 25-34 ปี (149 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



Number of Scrub Typhus cases by week of onset and region.
2566

