

Melioidosis

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 4122 ราย จาก 70 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 6.23 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 101 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.15 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.45 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ >65 ปี (27.78 %) 55-64 ปี (26.42 %) 45-54 ปี (21.20 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 99.0 ลาวร้อยละ 0.4 อื่นๆร้อยละ 0.3 กัมพูชา ร้อยละ 0.2 พม่าร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 46.0 รับจ้างร้อยละ 20.4 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 13.0

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ
แรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสาคร
สมุทรสงคราม ปทุมธานี นครปฐม สิงห์บุรี อ่างทอง
ระนอง


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (86 ราย), 55-64 ปี (63 ราย), 45-54 ปี (53 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (922 ราย), 55-64 ปี (878 ราย), 45-54 ปี (716 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (111 ราย), >65 ปี (100 ราย), 45-54 ปี (74 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (37 ราย), >65 ปี (37 ราย), 45-54 ปี (31 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



Number of Melioidosis cases by week of onset and region.
2566

