

Liver fluke

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 2159 ราย จาก 22 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 3.26 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.84 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 55-64 ปี (35.62 %) >65 ปี (26.08 %) 45-54 ปี (25.06 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 100.0 ลาวร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 64.6 รับจ้างร้อยละ 15.1 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 6.4

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (7 ราย), >65 ปี (4 ราย), 45-54 ปี (4 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (347 ราย), 45-54 ปี (297 ราย), >65 ปี (219 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (415 ราย), >65 ปี (340 ราย), 45-54 ปี (240 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



Number of Liver fluke cases by week of onset and region.

2566

