

Filariasis


d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 13 ราย จาก 6 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.02 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.30 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ >65 ปี (30.77 %) 15-24 ปี (15.38 %) 25-34 ปี (15.38 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 76.9 พม่าร้อยละ 15.4 ลาวร้อยละ 7.7 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 38.5 ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 23.1 รับจ้างร้อยละ 23.1


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (1 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (1 ราย), 45-54 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (1 ราย), 15-24 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (3 ราย), 55-64 ปี (2 ราย), 25-34 ปี (1 ราย),



อัตราต่อแสนประชากร



Number of Filariasis cases by week of onset and region.

2566

