

Condyloma Acuminata

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 5026 ราย จาก 75 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 7.60 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.66 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (47.45 %) 25-34 ปี (24.79 %) 35-44 ปี (12.20 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 95.2 อื่นๆร้อยละ 2.0 พม่าร้อยละ 1.5 ลาวร้อยละ 0.8 กัมพูชาร้อยละ 0.4 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 31.1 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 26.7 นักเรียนร้อยละ 26.1


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดระนอง นราธิวาส ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (828 ราย), 25-34 ปี (597 ราย), 35-44 ปี (309 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (759 ราย), 25-34 ปี (300 ราย), 35-44 ปี (143 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (579 ราย), 25-34 ปี (225 ราย), 35-44 ปี (91 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (219 ราย), 25-34 ปี (124 ราย), 35-44 ปี (70 ราย),



ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร



Number of Condyloma Acuminata cases by week of onset and regio
2566

