

Other STI

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 5617 ราย จาก 71 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 8.49 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 18.64 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 25-34 ปี (25.55 %) 35-44 ปี (22.16 %) 15-24 ปี (20.17 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 93.6 พม่าร้อยละ 2.1 อื่นๆร้อยละ 1.9 กัมพูชาร้อยละ 1.4 ลาวร้อยละ 1.0 มาเลเซียร้อยละ 0.1 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 35.7 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 24.2 เกษตรร้อยละ 14.8


จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม อ่างทอง นครนายก ระนอง อำนาจเจริญ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (625 ราย), 35-44 ปี (503 ราย), 15-24 ปี (391 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (399 ราย), 35-44 ปี (367 ราย), 25-34 ปี (359 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (341 ราย), 15-24 ปี (341 ราย), 35-44 ปี (288 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (110 ราย), 35-44 ปี (87 ราย), 15-24 ปี (74 ราย),



ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร



Number of Other STI cases by week of onset and region.

2566

