

Streptococcus suis

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 605 ราย จาก 50 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.91 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 34 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.05 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.53 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ >65 ปี (36.86 %) 55-64 ปี (28.93 %) 45-54 ปี (21.65 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 98.8 พม่าร้อยละ 0.8 อื่นๆร้อยละ 0.2 ลาวร้อยละ 0.2 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้างร้อยละ 29.3 เกษตรร้อยละ 28.3 งานบ้านร้อยละ 16.4

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (41 ราย), 45-54 ปี (18 ราย), 55-64 ปี (16 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (62 ราย), 45-54 ปี (59 ราย), 55-64 ปี (52 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (108 ราย), 55-64 ปี (100 ราย), 45-54 ปี (46 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (12 ราย), 45-54 ปี (8 ราย), 55-64 ปี (7 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



Number of Streptococcus suis cases by week of onset and region.

2566

