

Zika virus

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 830 ราย จาก 36 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.25 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.32 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 25-34 ปี (23.25 %) 35-44 ปี (22.53 %) 45-54 ปี (16.02 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 94.5 อื่นๆร้อยละ 4.6 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.4 พม่าร้อยละ 0.4 กัมพูชาร้อยละ 0.1 ลาวร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 28.2 รับจ้างร้อยละ 20.5 นักเรียนร้อยละ 13.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (133 ราย), 35-44 ปี (116 ราย), 45-54 ปี (89 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (15 ราย), 0-27 วัน (12 ราย), 35-44 ปี (12 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (52 ราย), 25-34 ปี (44 ราย), 15-24 ปี (42 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (7 ราย), 55-64 ปี (1 ราย), 15-24 ปี (1 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



Number of Zika virus cases by week of onset and region.
2566

