

Genital Molluscum Contagiosum

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 106 ราย จาก 17 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.16 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย
อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.00 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 25-34 ปี (23.58 %) 0-4 ปี (22.64 %) 35-44 ปี (16.04 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 84.9 อื่นๆร้อยละ 11.3 พม่าร้อยละ 1.9 ลาวร้อยละ 1.9 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 62.3 นักเรียนร้อยละ 15.1 รับจ้างร้อยละ 13.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (24 ราย), 15-24 ปี (11 ราย), 35-44 ปี (10 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (2 ราย), 4 ปี (1 ราย), 45-54 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (6 ราย), 15-24 ปี (2 ราย), 2 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 3 ปี (1 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



Number of Genital Molluscum Contagiosum cases by week of onset and region, 2566

