

Enterovirus Fever

d50666

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค ปี 2566 พบผู้ป่วย 174 ราย จาก 27 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.26 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.78 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี (63.79 %) 5 ปี (8.62 %) 7-9 ปี (8.62 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 87.4 อื่นๆร้อยละ 9.8 กัมพูชาร้อยละ 1.7 พม่าร้อยละ 1.1 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 73.0 นักเรียนร้อยละ 21.3 รับจ้างร้อยละ 2.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 4 ปี (18 ราย), 3 ปี (16 ราย), 2 ปี (16 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 1 ปี (3 ราย), 5 ปี (3 ราย), 3 ปี (2 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (2 ราย), 55-64 ปี (1 ราย), 5 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 1 ปี (8 ราย), 3 ปี (8 ราย), 2 ปี (6 ราย),



This plug-in isn't supported

อัตราต่อแสนประชากร



Number of Enterovirus Fever cases by week of onset and region.

2566

