

Cholera

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Cholera พบผู้ป่วย 8 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 18 ธค 67 จาก 7 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.01 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.67 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ >65 ปี (37.50 %) 35-44 ปี (25.00 %) 25-34 ปี (12.50 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 100.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 87.5 รับจ้างร้อยละ 12.5

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ


ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (1 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (1 ราย), 15-24 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (2 ราย), 25-34 ปี (1 ราย), 55-64 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ



ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

Number of Cholera cases by week of onset and region.
2567



อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

ชนิดของเชื้อ/สาร	จำนวน	ร้อยละ
Vibrio cholerae Eltor	1	12.5
Inaba		
Vibrio Cholerae	1	12.5
Eltor Ogawa		
NA	2	25.0
NA	4	50.0