

Food_Poisoning

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Food_Poisoning พบผู้ป่วย 127289 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 23 ธค 67 จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 192.36 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.69 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 25-34 ปี (15.55 %) 15-24 ปี (14.65 %) >65 ปี (12.59 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 98.1 อื่นๆร้อยละ 0.6 พม่าร้อยละ 0.6 ลาวร้อยละ 0.4 กัมพูชาร้อยละ 0.2 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 มาเลเซียร้อยละ 0.0 เวียดนามร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ไม่ปกครองร้อยละ 36.3 นักเรียนร้อยละ 23.2 รับจ้างร้อยละ 17.6

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (8359 ราย), 15-24 ปี (5897 ราย), 35-44 ปี (5043 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (9018 ราย), 15-24 ปี (7610 ราย), 55-64 ปี (7125 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (3375 ราย), >65 ปี (3273 ราย), 25-34 ปี (3071 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1771 ราย), 25-34 ปี (1708 ราย), 35-44 ปี (1019 ราย),




ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Food_Poisoning cases by week of onset and region.
2567



ชนิดของเชื้อ/สาร	จำนวน	ร้อยละ
Vibrio parahaemolyticus (V.P)	8653	6.8
Salmonella spp.	61	0.0
Staphylococcus	73	0.1
Botulism	101	0.1
Clostridium perfringens	81	0.1
Unknown	118320	93.0