

Pertussis

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Pertussis พบผู้ป่วย 1272 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 22 ธค 67 จาก 33 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.92 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.05 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี (67.53 %) 7-9 ปี (6.37 %) 10-14 ปี (5.90 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.5 อื่นๆร้อยละ 1.7 พม่าร้อยละ 0.6 ลาวร้อยละ 0.2 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 79.6 นักเรียนร้อยละ 17.0 รับจ้างร้อยละ 1.6

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 10-14 ปี (28 ราย), 15-24 ปี (22 ราย), 25-34 ปี (13 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (2 ราย), >65 ปี (2 ราย), 2 ปี (1 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 1-3 เดือน (4 ราย), 4-5 เดือน (2 ราย), 10-14 ปี (1 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 1 ปี (215 ราย), 6-8 เดือน (111 ราย), 2 ปี (109 ราย),




ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Pertussis cases by week of onset and region.
2567



© Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, Ministry of Public Health