

D.H.F.shock syndrome

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค D.H.F.shock syndrome พบผู้ป่วย 872 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 22 ธค 67 จาก 70 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.32 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 54 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.08 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.88 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (28.56 %) 10-14 ปี (16.06 %) 25-34 ปี (14.33 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 94.2 พม่าร้อยละ 2.9 อื่นๆร้อยละ 1.1 ลาวร้อยละ 1.0 กัมพูชาร้อยละ 0.6 เวียดนามร้อยละ 0.1 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ นักเรียนร้อยละ 36.6 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 31.0 รับจ้างร้อยละ 18.9

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสงคราม อ่างทอง แพร่ สกลนคร พังงา กระบี่ สตูล ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (39 ราย), 10-14 ปี (32 ราย), 25-34 ปี (31 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (46 ราย), 10-14 ปี (46 ราย), 25-34 ปี (24 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (65 ราย), 25-34 ปี (32 ราย), 35-44 ปี (29 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (99 ราย), 10-14 ปี (49 ราย), 25-34 ปี (38 ราย),



ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

umber of D.H.F.shock syndrome cases by week of onset and regio
2567

