

Leptospirosis

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Leptospirosis พบผู้ป่วย 4339 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 23 ธค 67 จาก 73 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 6.56 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 48 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.07 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.29 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 55-64 ปี (19.75 %) 45-54 ปี (18.67 %) >65 ปี (18.67 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.8 พม่าร้อยละ 2.3 ลาวร้อยละ 0.6 กัมพูชาร้อยละ 0.2 อื่นๆร้อยละ 0.1 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 32.1 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 25.3 รับจ้างร้อยละ 21.5

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ
แรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสิงห์บุรี
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ตราด
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (43 ราย), 45-54 ปี (34 ราย), 25-34 ปี (25 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (338 ราย), 45-54 ปี (329 ราย), >65 ปี (308 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (261 ราย), 55-64 ปี (227 ราย), 45-54 ปี (163 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (323 ราย), 25-34 ปี (299 ราย), 45-54 ปี (284 ราย),



ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

□0

Number of Leptospirosis cases by week of onset and region.
2567

