

Mushroom poisoning

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Mushroom poisoning พบผู้ป่วย 3065 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 20 ธค 67 จาก 68 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 4.63 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 11 ราย คิดเป็นอัตราตาย 0.02 ต่อแสนประชากร อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.92 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ >65 ปี (27.60 %) 55-64 ปี (23.39 %) 45-54 ปี (21.01 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.2 พม่าร้อยละ 1.7 ลาวร้อยละ 0.7 กัมพูชาร้อยละ 0.3 อื่นๆร้อยละ 0.2 อาชีพส่วนใหญ่ เกษตรร้อยละ 48.7 รับจ้างร้อยละ 19.4 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 15.2

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ
แรกคือ จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยคือจังหวัดสมุทรสาคร
สมุทรสงคราม สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง
นครนายก ลำพูน พังงา นราธิวาส
ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (33 ราย), >65 ปี (29 ราย), 55-64 ปี (26 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ >65 ปี (732 ราย), 55-64 ปี (606 ราย), 45-54 ปี (533 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 55-64 ปี (67 ราย), >65 ปี (61 ราย), 45-54 ปี (54 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (35 ราย), >65 ปี (24 ราย), 45-54 ปี (24 ราย),



ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

□0

Number of Mushroom poisoning cases by week of onset and region

2567

