

Condyloma Acuminata

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Condyloma Acuminata พบผู้ป่วย 9654 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 23 ธค 67 จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 14.59 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.65 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 15-24 ปี (43.25 %) 25-34 ปี (28.04 %) 35-44 ปี (13.64 %) สัญชาติเป็นไทย ร้อยละ 94.4 อื่นๆร้อยละ 2.9 พม่าร้อยละ 1.3 ลาวร้อยละ 0.8 กัมพูชาร้อยละ 0.3 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.2 เวียดนาม ร้อยละ 0.0 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพในปกครองร้อยละ 53.6 รับจ้างร้อยละ 19.7 นักเรียนร้อยละ 14.7

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1945 ราย), 25-34 ปี (1528 ราย), 35-44 ปี (777 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (1038 ราย), 25-34 ปี (446 ราย), 35-44 ปี (196 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (731 ราย), 25-34 ปี (338 ราย), 35-44 ปี (143 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี (461 ราย), 25-34 ปี (395 ราย), 35-44 ปี (201 ราย),



ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

umber of Condyloma Acuminata cases by week of onset and regio

2567

