

Chikungunya

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Chikungunya พบผู้ป่วย 709 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 20 ธค 67 จาก 60 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1.07 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.59 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 45-54 ปี (20.03 %) 35-44 ปี (18.90 %) 25-34 ปี (17.91 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 97.3 อื่นๆ ร้อยละ 1.4 พม่าร้อยละ 0.7 ลาวร้อยละ 0.3 กัมพูชาร้อยละ 0.1 จีน/ฮ่องกง/ไต้หวันร้อยละ 0.1 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 46.5 รับจ้างร้อยละ 21.3 นักเรียนร้อยละ 11.3

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (66 ราย), 35-44 ปี (55 ราย), 25-34 ปี (43 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 45-54 ปี (51 ราย), 25-34 ปี (46 ราย), 55-64 ปี (38 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (34 ราย), >65 ปี (19 ราย), 45-54 ปี (17 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 25-34 ปี (26 ราย), 35-44 ปี (16 ราย), 15-24 ปี (14 ราย),



ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Chikungunya cases by week of onset and region.
2567

