

Enterovirus Fever

d50667

ข้อมูลเฝ้าระวังโรค Enterovirus Fever พบผู้ป่วย 407 ราย พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 1 มค 2567 ผู้ป่วยรายสุดท้ายวันที่ 23 ธค 67 จาก 50 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 0.62 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 0 ราย อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1: 0.86 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 0-4 ปี (59.95 %) 7-9 ปี (13.27 %) 5 ปี (9.09 %) สัญชาติเป็นไทยร้อยละ 96.8 อื่นๆร้อยละ 2.5 พม่าร้อยละ 0.5 ลาวร้อยละ 0.2 อาชีพส่วนใหญ่ ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 73.2 นักเรียนร้อยละ 25.1 งานบ้านร้อยละ 0.5

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับแรกคือ

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ตามลำดับ

- ภาคกลาง พบมากในกลุ่มอายุ 7-9 ปี (46 ราย), 3 ปี (42 ราย), 1 ปี (40 ราย),
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 1 ปี (7 ราย), 2 ปี (5 ราย), 6 ปี (4 ราย),
- ภาคเหนือ พบมากในกลุ่มอายุ 3 ปี (13 ราย), 1 ปี (11 ราย), 5 ปี (6 ราย),
- ภาคใต้ พบมากในกลุ่มอายุ 1 ปี (11 ราย), 2 ปี (5 ราย), 3 ปี (5 ราย),



ไม่รองรับปลั๊กอินนี้

อัตราต่อแสนประชากร

□ 0

Number of Enterovirus Fever cases by week of onset and region.

2567

